



Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Številka: 181-172/2020/80
Datum: 27. 1. 2021

Zadeva: DODATNA POJASNILA - Nujnost testiranja na COVID-19 ob pojavu novega seva virusa SARS-CoV-2
Zveza: naš dopis št. 181-172/2020/71 z dne 26. 1. 2021

Z dopisom št. 181-172/2020/71 z dne 26. 1. 2021 smo vam poslali obvestilo, ki se nanaša na nujnost testiranja na COVID-19 ob pojavu novega seva virusa SARS-CoV-2. V zvezi s tem se je pojavilo nekaj dilem in vprašanj, zato vam v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila.

Že v dopisu številka 181-172/2020/68 z dne 6.11.2020 smo pozvali vse izvajalce na primarni ravni, da se brisi jemljejo pri vseh pacientih s sumom na covid-19. Z dopisom št. 181-172/2020/71 z dne 26. 1. 2021 smo želeli to potrebo samo ponovno poudariti, in sicer zaradi hitrega širjenja novih, bolj prenosljivih sevov virusa SARS-CoV-2 v Evropi in Sloveniji.

Kot izhaja iz prej navedenih obvestil, je potrebo na testiranje napotiti vse osebe s simptomi in znaki oziroma s sumom na COVID-19. V tem trenutku je to še bolj pomembno, zaradi čim hitrejšje identifikacije novih, bolj prenosljivih sevov virusa SARS-CoV-2. Prvega obolelega v družini se torej napoti na PCR testiranje najkasneje v 24 urah. Če oziroma ko zbolijo naslednji član družine (iz skupnega gospodinjstva) se ga prav tako testira, saj velja pravilo testiranja vsakega obolelega, pri čemer se lahko pri tej osebi opravi PCR ali HAGT testiranje. S testiranjem nadaljujemo pri vseh družinskih članih oziroma članih skupnega gospodinjstva, pri katerih se pojavijo znaki obolenja. Dokazana informacija o preboleli okužbi je v pomoč tudi pri načrtovanju cepljenja proti covid-19 in v vseh ostalih primerih, ko je pomembno vedeti, ali in kdaj je oseba že prebolela bolezen.

Testiranje po zaključku izolacije pri preboleznikih z laboratorijsko dokazano boleznijo seveda ni bilo in tudi še naprej ni potrebno. Tega predhodno poslani dopis tudi ni predvideval in navodila za zaključek izolacije se ne spreminjajo.

V dopisu smo prav tako priporočali testiranje visoko rizičnih kontaktov ob zaključku karantene. Priporočilo se nanaša na osebe, ki npr. živijo v skupnem gospodinjstvu z obolelim, pa ne razvijejo znakov bolezni tudi sami. Ob izvajanju množičnega presejalnega testiranja se je namreč izkazalo, da je v populaciji kar nekaj odstotkov oseb, ki okužbo prebolevajo asimptomatsko. S testiranjem oseb, ki med karanteno kljub tesnemu stiku z obolelim niso zboleli, želimo torej identificirati morebitne asimptomatske bolnike, da bi preprečili širitev okužbe ob vrnitvi v službo oziroma šolo (ob zaključku karantene). Ker se zavedamo velikih obremenitev vsega osebja na primarni ravni, smo to testiranje zapisali kot priporočljivo. Ne gre torej za obvezno, ampak priporočljivo testiranje. Vsak izvajalec se na podlagi razpoložljivih podatkov,

strokovne presoje in možnosti testiranja v svojem okolju odloči glede možnosti in načina izvedbe tega testiranja. Ker gre za asimptomatske osebe, predvidevamo tudi možnost priporočila tesnim stikom, da se udeležijo presejalnega testiranja s HAGT ali preventivnega testiranja v okviru testiranja pri delodajalcu. Priporočilo za testiranje družinskih članov, ki niso zboleli, se nanaša tudi na otroke. Ob bodočem vključevanju v vzgojno izobraževalni proces je informacija o preboleli okužbi zelo koristna. V primeru, da je oseba ob koncu karantene pozitivna s HAGT ali PCR, je to laboratorijski dokaz bolezni in kljub temu, da nima simptomov, ostane v izolaciji 10 dni od pozitivnega testa (enako kot prej, ker ne moremo na drug način določati začetka bolezni).

Zahvaljujemo se vsem, ki ste opozorili na nejasnosti in upamo, da smo z dodatnimi pojasnili odgovorili na vsa vprašanja.

S spoštovanjem,

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Vročiti:

- Izvajalci zdravstvene dejavnosti – po e-pošti
- Drugi po seznamu – po e-pošti